


VII ENCUESTA DE Anticoncepción en España 2011



Science For A Better Life



Objetivos

Principal

Conocer los hábitos anticonceptivos de la población femenina en edad fértil

Secundarios

- Profundizar en los aspectos que influyen en el proceso de toma de decisiones para elegir un método anticonceptivo determinado.
- Analizar la evolución en los hábitos y pautas anticonceptivas de la mujer española.





Metodología

Universo:	Mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años)
Ámbito:	Nacional (España)
Tamaño muestral:	2.096 entrevistas personales
Trabajo de campo:	23-05-2011 – 08-06-2011
Error de muestreo:	2,18%, nivel de confianza k=2 (95,5%)





Nº de encuestadas por edad

2011	N	%
De 15 a 19 años	219	10,4%
de 20 a 24	273	13,0%
de 25 a 29	335	16,0%
de 30 a 34	337	16,1%
de 35 a 39	328	15,6%
de 40 a 44	317	15,1%
de 45 a 49 años	287	13,7%
Total	2096	100,0%

Base: Toda la muestra



Comparativa

Encuesta/INE - Estado civil



2011	VII Encuesta	* INE
	N	%
Soltera	40,6%	42,5%
Casada	51,3%	51,6%
Separada/divorciada	6,8%	5,2%
Viuda	0,6%	0,8%
Ns/Nc	0,7%	0,0%
Total	100,0%	100,0%

*Fuente: EPA 2007. Instituto Nacional de Estadística

Base: Toda la muestra



Comparativa

Datos encuesta/INE - Ocupación



2011	VII Encuesta	* INE
	N	%
Trabaja por cuenta ajena	53,5%	54,4%
Trabaja por cuenta propia	8,2%	7,0%
En Paro	15,7%	7,9%
Jubilada/pensionista	0,7%	0,9%
Trabajo doméstico no remunerado	5,6%	17,2%
Estudiante	16,2%	10,6%
Otra	0,0%	2,0%
Ns/Nc	0,1%	0,0%
Total	100,0%	100,0%

*Fuente: EPA 2007. Instituto Nacional de Estadística

Base: Toda la muestra




Evolución

Utilización de métodos anticonceptivos




¿Utilizas algún método anticonceptivo?


Base: Toda la muestra



Evolución años anteriores




Mujeres que utilizan métodos por edad



Base: Toda la muestra



Razones para no utilizar métodos




Base: 519 mujeres no usuarias de métodos (respuesta múltiple)



Riesgo de embarazo no deseado por no uso de método



Base: 519 mujeres no usuarias de métodos (respuesta múltiple)



Si No





Métodos anticonceptivos utilizados

	1997	1999	2001	2003	2007	2009	2011
Preservativo	21,0%	21,9%	29,5%	31,9%	38,8%	37,3%	35,6%
Píldora	14,3%	16,5%	19,2%	18,3%	20,3%	17,9%	16,3%
Doble Método					0,4%	1,5%	1,3%
DIU	5,7%	5,9%	4,7%	4,6%	4,5%	4,9%	5,2%
Pareja Vasectomizada		6,4%	6,5%	6,8%	4,3%	4,6%	5,7%
Ligadura de Trompas	5,2%	4,5%	5,3%	5,3%	4,1%	4,3%	3,3%
Otros (Anillo, Parche, Impl,...)	0,5%	0,5%	0,7%	1,1%	4,5%	5,7%	5,3%
Coitus Interruptus	1,5%	4,3%	2,6%	2,9%	2,5%	2,2%	2,2%
Método Ogino o Naturales	0,9%	0,7%	0,6%	0,3%	0,5%	0,6%	0,3%
Ninguno	50,9%	39,3%	30,9%	28,8%	20,1%	21,0%	24,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Base: Toda la muestra



Métodos anticonceptivos por edad




	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Total
Preservativo	46,1%	39,6%	43,9%	37,4%	32,3%	29,3%	22,6%	35,6%
Píldora	11,4%	28,2%	23,9%	17,2%	15,5%	11,4%	4,9%	16,3%
Doble Método	3,2%	2,2%	1,5%	1,8%	0,9%	0,0%	0,3%	1,3%
DIU	0,0%	1,8%	2,1%	5,9%	7,6%	6,6%	11,1%	5,2%
Vasectomía	0,0%	0,7%	0,6%	1,8%	6,7%	12,0%	17,1%	5,7%
Ligadura	0,0%	0,0%	0,3%	1,2%	4,9%	7,9%	8,0%	3,3%
Otros (anillo, parche,implante..)	3,7%	11,0%	8,4%	7,7%	2,7%	2,5%	0,7%	5,3%
C. Interrumpido	0,0%	1,8%	2,4%	2,4%	2,4%	4,1%	1,7%	2,2%
Naturales	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,9%	0,6%	0,0%	0,3%
Ninguno	35,6%	14,7%	17,0%	24,3%	25,9%	25,6%	33,4%	24,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Base: Toda la muestra



Doble método



Base: 2096 mujeres, toda la muestra




Base: 741 mujeres que conocen el DM






Uso del preservativo

Uso consistente



Base: 745 usuarias de preservativo masculino

POR EDADES




Base: 151 usuarias de preservativo masculino que no lo utilizan consistentemente





Motivos del uso inconsistente



- Lo imprevisto de la relación
- Por no interrumpir la relación
- Estado de euforia por consumo de alcohol/drogas
- No quiso la pareja
- Uso de otro método anticonceptivo
- Otros
- Ns/Nc


Base: 151 usuarias de preservativo masculino que no lo utilizan consistentemente



Fuentes de información Sobre métodos anticonceptivos




Donde te informas



Base: 2096 mujeres,

Evolución años




- Internet, redes sociales y medios tradicionales incluido en Medios de comunicación
- Info sanitaria- ginecólogo, médico general, especialistas, profesionales sanitarios y folletos de consulta médica

Fuentes de información

Sobre métodos anticonceptivos - por edades



Donde te informas



Base: 2096 mujeres


Entorno social = familia, amigos y el colegio – para los más jóvenes el colegio es una fuente tan importante como los amigos





Motivo para el NO uso de píldora

Motivos para no usar la píldora entre las no usuarias con necesidades anticonceptivas




Base: 761 mujeres que nunca han usado la píldora y tienen necesidades anticonceptivas.

Respuesta múltiple



Motivo de inicio de la píldora fines anticonceptivos / otros motivos




Base: Base: 341 usuarias actuales de píldora (resp múltiple)



Fines no anticonceptivos Encontrados y buscados




Fines no anticonceptivos encontrados



Base: 316 usuarias actuales de píldora con fines AC

Fines no anticonceptivos buscados




Base: 144 usuarias actuales de píldora con otros fines no AC



Descanso en el uso de la píldora

¿Realizas algún tipo de descanso?




Base: 341 usuarias actuales de píldora



2011




Total Mujeres 15-49 años: 11.605.731



% vs población total

*Base: Total de la muestra

2011 Riesgo de embarazo no deseado por edades



■ Preservativo inconsistente ■ No uso (con necesidad anticonceptiva) ■ método de baja eficacia ■ metodo Adecuado ■ No necesita metodo

	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Total
Riesgo embarazo no deseado	9,13%	14,29%	16,72%	18,40%	20,12%	20,82%	14,98%	16,79%



Conclusiones

- Consolidación del **uso favorable de métodos** seguros y eficaces
- La **píldora y el preservativo** son los métodos más usados en todas las franjas de edad
- Se mantiene una **alta exposición al riesgo**
- Por un no uso de métodos, uso de métodos ineficaces o **uso inconsistente del preservativo**
- El mal uso del preservativo va **intrínseco en el propio método** por la interferencia en las relaciones sexuales
- También influye el **mantenimiento de falsas creencias de métodos como la píldora** que se perpetúan por la importancia del entorno social como fuente de información
- Necesidad de incidir en la mejora de la información y la educación iniciados desde en los **tramos de edad más jóvenes**



Conclusiones



La educación determina los comportamientos (Informe CSIC)

