



YACUTORO (*Pyroderus scutatus*), YETAPÁ NEGRO (*Colonia colonus*), CHIVÍ CORONADO (*Hylophilus poicilotis*) Y TACUARITA BLANCA (*Poliophtila lactea*) EN EL NORDESTE DE CORRIENTES, ARGENTINA

Jorge La Grotteria¹, Marcelo Gavensky² y Andrés Terán³

¹ Martin H. Falco 328, Garín (1619), Escobar, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: jorgelg21@hotmail.com

² Galicia 1320, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1416). Correo electrónico: gavensmar@gmail.com

³ Entre Ríos 190, Rosario (2000), Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: andymillo33@gmail.com

La Selva Atlántica Interior se encuentra en Argentina principalmente en la provincia de Misiones y nordeste de Corrientes, siendo considerada una de las ecoregiones de mayor diversidad y más críticamente amenazadas a nivel mundial (Giraudo y Povedano, 2004). El área del sur de Misiones y nordeste de Corrientes denominada Distrito de los Campos, por la transición con el dominio chaqueño y existencia de pastizales (Cabrera, 1976), es una de las áreas con mayor cantidad de especies de aves del país debido a su diversidad de ambientes (Giraudo y Povedano, 2004). La selva se encuentra representada en los márgenes ribereños, y en forma de capones o mogotes entre pastizales y humedales (Giraudo y Povedano, 2004; Capllonch *et al.*, 2005). Dentro de la provincia de Corrientes, las selvas en galería entre las localidades de Garruchos y Santo Tomé resguardan el sector con mayor cantidad de elementos paranaenses de la provincia y aún subsisten numerosas aves de selva (Chebez, 2005). La provincia de Corrientes presenta numerosos relevamientos de especies aunque el conocimiento de la avifauna aún es escaso debido a que hay zonas aún no relevadas que funcionan como refugios faunísticos de difícil acceso por ser zonas inundables o separadas por ríos y arroyos (Capllonch *et al.*, 2005). A continuación presentamos registros de cuatro especies raras o escasas para Corrientes, que fueron halladas en selvas del nordeste de la provincia y ambientes aledaños.

Yacutoro (*Pyroderus scutatus*)

Especie señalada para la provincia de Misiones y nordeste de Corrientes (Chebez, 2009; Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013). Fue citada por primera vez para Corrientes en "Concepción" por Reboratti (1918). Los datos de Contreras (1987b) y Olrog (1979) posiblemente repiten esa mención (Chebez, 2009). Nores *et al.* (2005) señalan como límite austral de esta especie la localidad de Garruchos. Recientemente Chatellenaz *et al.* (2012) la citan en predios pertenecientes a la Empresa Las Marías S.A., Departamento Santo Tomé, el 2 de

marzo de 2013 en base a la observación de un ejemplar en un sector de bosque nativo. En febrero de 2013, Patricia Haynes observó en varias oportunidades un Yacutoro (Figura N° 1) en el casco de la Estancia Virocay (28° 15' 51,2" S; 55° 57' 54,2" O), Departamento de Santo Tomé, Corrientes. La primera vez, el ejemplar se encontraba en un árbol de guayabas que está en el patio del establecimiento y se lo detectó a partir de su vocalización. Luego fue observado en un árbol de nísperos y en la huerta donde hay otras frutas como palta, mamón y también, guayabas. El 15 de febrero pudo obtener una fotografía del mismo posado en un Loro Negro (*Cordia trichotoma*). Estos registros podrían estar relacionados con el de Chatellenaz *et al.* (2012) debido a su proximidad espacial y temporal, ya que se sitúan escasamente más al sur y ocurrieron durante el mes anterior. Se adiciona información con evidencia fotográfica de la especie para la provincia de Corrientes.

Yetapá Negro (*Colonia colonus*)

Especie señalada para la provincia de Misiones, norte de Corrientes y Formosa (Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013), citada para la provincia de Corrientes en Contreras (1987a; 1987b). Nores *et al.* (2005) señalan su límite austral de distribución hasta la localidad de Santa María. El 18 de marzo de 2013, en la Reserva Natural de Santo Tomé "Tajy Poty", Santo Tomé, Corrientes, los observadores Marcelo Gavensky, Siri Omberg y Patricia Haynes observaron un ejemplar de Yetapá Negro (Figura N° 2). El mismo permaneció largo tiempo posado en lo alto del dosel, realizando vuelos para atrapar insectos voladores. Al ejemplar le faltaba una de sus timoneras centrales. La reserva Tajy Poty protege ambientes de selva en galería del río Uruguay, con muchos elementos misioneros, y su ecotono con la región de los Campos y Malezales. Este registro constituye la localidad más austral de la especie para Argentina y adiciona información con evidencia fotográfica de la especie para la provincia de Corrientes.



Figura N° 1. Yacutoro (*Pyroderus scutatus*) en la Estancia Virocay, Departamento de Santo Tomé, Corrientes, Argentina, posado en un Loro Negro (*Cordia trichotoma*), el 15 de febrero de 2013. Fotografía: Patricia Haynes.



Figura N° 2. Yetapá Negro (*Colonia colonus*) en la Reserva Natural de Santo Tomé, Santo Tomé, Corrientes, Argentina, 13 de marzo de 2013. Fotografía: Siri Omberg.



Chiví Coronado (*Hylophilus poicilotis*)

Especie señalada para la provincia de Misiones y nordeste de Corrientes (Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013). Solo presenta una cita para Corrientes en 1993 que consiste en una grabación de su vocalización (Darrieu y Camperi, 1993). Luego, Nores *et al.* (2005) la mencionan con límite austral hasta la localidad de Garruchos sin dar mayores detalles, probablemente en base a la anterior cita. El 8 de diciembre de 2015, recorriendo selvas en galería de la localidad de Colonia Garabí (28° 14' 4,5" S; 55° 46' 9,2" O), Corrientes, Jorge La Grotteria y Andrés Terán detectaron un ejemplar de la especie por su vocalización, el cual fue grabado y fotografiado (Figura N° 3). El mismo se encontraba por las copas de los árboles en una zona densa de bosque inundado por las crecidas del Río Uruguay (Figura N° 4). El individuo se encontraba solitario, compartiendo por algunos instantes su espacio con dos ejemplares de Tangará Común (*Euphonia chlorotica*) y vocalizaba al mismo tiempo que un Burlisto Pico Canela (*Myiarchus swainsoni*). Este registro constituye la localidad más austral de la especie para Argentina y adiciona información con evidencia fotográfica para la provincia de Corrientes.

Tacuarita Blanca (*Poliophtila lactea*)

Especie señalada para la provincia de Misiones y nordeste de Corrientes (Chebez, 2009; Narosky e Yzurieta, 2010; De la Peña, 2013). Citada para Corrientes por Darrieu y Camperi (1993) y Giraud (1996). Considerada Vulnerable para Argentina (AA/AOP y SA y DS, 2008). Nores *et al.* (2005) señalan su límite austral hasta la localidad de Colonia Garabí. El 4 de diciembre de 2012, los observadores Marcelo Gavensky y Patricia Haynes observaron a esta especie en selva en galería en proximidades de la localidad de Garruchos (28° 10' 42,8" S; 55° 39' 1,1" O), Departamento de Santo Tomé. Al año siguiente, los mismos observadores avistaron nuevamente ejemplares de Tacuarita Blanca en un ambiente similar, en la localidad de Colonia Garabí, el 18 de marzo de 2013. En ambas oportunidades las aves se encontraban en el dosel de la selva, en el borde de la misma, muy cerca del ecotono con pastizal. Finalmente, el 23 de agosto de 2013 ambos observadores, en conjunto con los fotógrafos Sergio Castedo y Rodolfo Seró, volvieron a observar la especie en el borde de selva en galería de Colonia Garabí (Figura N° 5). En esta oportunidad las tacuaritas utilizaron un árbol aislado de la selva, en medio de un área deforestada, y fueron

observadas moviéndose activamente por distintas alturas.

AGRADECIMIENTOS

A Patricia Haynes por sus generosos aportes de observaciones personales y fotografía, a Alejandro Valentín Franzoy por el aporte bibliográfico y sugerencias, a Siri Omberg y Sergio Castedo por sus fotografías, a David Haynes por la información brindada, y a Daniela Espinosa y Francisco Lucero por los aportes al manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

- AVES ARGENTINAS/AOP & SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 2008. *Categorización de las aves de la Argentina según su estado de conservación*. Aves Argentinas /AOP y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires.
- CABRERA, A. L. 1976. *Regiones fitogeográficas argentinas*. Encicl. Argent. Agric. Jard. (2da. ed.), 2 (1): 1-85. Buenos Aires, Acme.
- CAPLLONCH, P., R. LOBO, D. ORTIZ Y R. OVEJERO. 2005. La avifauna de la selva de galería en el noreste de Corrientes, Argentina: Biodiversidad, Patrones de Distribución y Migración. *Insugeo*, Miscelánea, 14: 483-498.
- CHATELLENAZ, M. L., J. M. FERNÁNDEZ Y M. L. THOMANN. 2012. Nuevos registros de *Macropsalis forcipata*, *Cyanocorax caeruleus* y *Pyroderus scutatus* (Aves: Caprimulgidae, Corvidae y Cotingidae) en el nordeste de la provincia de Corrientes, Argentina. *Facena*, Vol. 28, pp 69-73.
- CHEBEZ, J. C. 2005. *Guía de las reservas naturales de la Argentina. Nordeste*. Editorial Albatros, 287 págs.
- CHEBEZ, J. C. 2009. *Otros que se van. Fauna Argentina Amenazada*. 552 págs. Albatros.
- CONTRERAS, J. R. 1987a. Algunas localidades interesantes para aves correntinas. *Nótulas Faunísticas*, 6: 1-2.
- CONTRERAS, J. R. 1987b. Lista preliminar de la avifauna correntina. *Historia Natural*, 7(6): 61-70.
- DARRIEU, C. A. Y A. R. CAMPERI. 1993. Estudio de una



colección de aves de Corrientes, Argentina. IV. (Phytotomidae a Parulidae). *Neotropica*, 39: 83-92.

DE LA PEÑA, M. R. 2013. *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: Edición ampliada*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7, Ediciones Biológica, 786 págs.

GIRAUDO, A. R. 1996. Adiciones a la avifauna de la provincia de Corrientes, Argentina y de zonas limítrofes del Paraguay. *Facena*, 12: 49-53.

GIRAUDO, A. R. Y H. POVEDANO. 2004. Avifauna de la región biogeográfica Paranaense o Atlántica Interior de Argentina: biodiversidad, estado del conocimiento y conservación. *Insugeo, Miscelánea*, 12: 331-348.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de*

Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

NORES, M., M. M. CERANA Y DIEGO A. SERRA. 2005. Dispersal of forest birds and trees along the Uruguay River in southern South America. *Diversity and Distributions, (Diversity Distrib.)*, 11: 205-217.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, XXVII, 324 págs., Fundación Miguel Lillo, Tucumán.

REBORATTI, J. H. 1918. Sobre la distribución geográfica de algunas especies de aves. *Hornero*, 1(3): 193b: 194.

Recibido: 4 de marzo de 2016

Aceptado: 10 de mayo de 2016



Figura N° 3. Ejemplar de Chiví Coronado (*Hylophilus poicilotis*) en selva en galería de Colonia Garabí, Corrientes, Argentina, el 8 de diciembre de 2015. Fotografía: Jorge La Grotteria.

eco registros EcoRegistros.org Registros Ecológicos de la Comunidad



Figura N° 4. Bosque inundado por creciete del Río Uruguay en Colonia Garabí, Corrientes, Argentina, el 8 de diciembre de 2015. Fotografía: Jorge La Grotteria.



Figura N° 5. Tacuarita Blanca (*Polioptila lactea*) en Colonia Garabí, Corrientes, Argentina el 23 de agosto de 2013. Fotografía: Sergio Castedo.